

Lingumelt® 2 mg Schmelztabletten: Zusammensetzung: 1 Schmelztabl. enth. 2 mg Loperamidhydrochlorid entspr. 1,85 mg Loperamid. **Sonst. Bestandt.:** Pullulan (E1204), Mannitol (E421), Natriumhydrogencarbonat (E500), Aspartam (E951), Polysorbat 80 (E433), Pfefferminz-Aroma (Mais maltodextrin, Aromastoffe u. modifizierte Wachsmaisstärke, E1450)

Anwendungsgebiet: Zur symptomatischen Behandlung von akuten Diarrhöen bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. **Gegenanz:** Überempfindlichkeit geg. d. Wirkst. od. einen d. sonst. Bestandt.; Kinder unter 2 Jahren; Durchfälle, die m. Fieber u./od. blutigem Stuhl einhergehen; akuter Schub e. Colitis ulcerosa; bakt. Darmentzündung hervorgerufen durch in d. Darmwand eindringende Erreger (z.B. Salmonellen, Shigellen, u. Campylobacter); Durchfälle, die während od. nach d. Einnahme v. Breitbandantibiotika auftreten (pseudomembranöse [antibiotikaassoziierte] Colitis). Loperamidhydrochlorid darf nicht verwendet werden b. Zuständen, bei denen e. Verlangsamung d. Darmtätigkeit wg. möglicher Risiken v. Folgeerscheinungen zu vermeiden ist. Diese schließen Ileus, Megacolon u. tox. Megacolon ein. Loperamidhydrochlorid muss sofort abgesetzt werden, wenn Obstipation, ein aufgetriebener Leib od. Ileus auftreten. **ATC-Code:** A07DA03. **Weitere Angaben: s. Fachinformation.** Apothekenpflichtig. 08/22-1 **Pharm. Unternehmer:** Klinge Pharma GmbH, 83607 Holzkirchen, Deutschland