

Pflichttext

Qualitative und quantitative Zusammensetzung: 100 ml enthalten: Aconitum napellus Dil. D6 0,75 ml; Capsicum annuum Dil. D4 0,75 ml; Chamomilla recutita Ø 2,25ml; Echinacea purpurea Ø 7,5 ml; Hydrargyrum bichloratum Dil. D6 0,75 ml; Hydrastis canadensis Dil. D4 0,75 ml; Iodum Dil. D4 0,75 ml; Natrium tetraboracicum Dil. D40,75 ml; Sambucus nigra Ø 2,25 ml; Sanguinaria canadensis Ø 0,75 ml. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Ethanol; Gesamtethanolgehalt ca. 53 Vol.-%. 1 ml (=0,93 g) entspricht ca. 27 Tropfen.

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen: Erkältungskrankheiten mit Entzündungen im Bereich des Mittelohres und Ohrenschmerzen. Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt. Otovowen® wird angewendet bei Kleinkindern ab 6 Monaten, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe, insbesondere gegen Pflanzen aus der Familie der Korbblütler wie z.B. Arnika, Chrysanthemen oder einen der sonstigen Bestandteile. Aus grundsätzlichen Erwägungen darf Otovowen® nicht eingenommen werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie und Leukämie-ähnlichen Erkrankungen, entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), Autoimmunerkrankungen, Multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder anderen chronischen Viruserkrankungen.

Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Die Anwendung bei Kindern unter 6 Monaten wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen. Dieses Arzneimittel enthält pro maximaler Einzeldosis von 4 / 7 / 10 / 15 Tropfen ca. 62 mg / 110 mg / 156 mg / 234 mg Alkohol. Es besteht ein gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit: Es liegen keine ausreichenden Daten zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen. Es liegen keine Daten zur Beeinflussung der Fertilität vor.

Wechselwirkungen mit and. Arzneimitteln u. sonst. Wechselwirkungen: Es sind keine Wechselwirkungen bekannt. Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Nebenwirkungen: Sehr selten – bei weniger als 1 v. 10000 Behandelten – können Überempfindlichkeitsreakt. auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. Die Häufigkeit des Auftretens ist nicht bekannt.

Dosierung: Bei **akuten Zuständen** alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, bei **chronischen Verlaufsformen** 1-3 mal täglich:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 12-15 Tropfen,

Kinder zwischen 6 und 12 Jahren: 5-10 Tropfen,

Kinder von 1 bis 6 Jahren: 4-7 Tropfen,

Kleinkinder von 6 bis 12 Monaten: 2-4 Tropfen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. **Kinder:** Die Anwendung bei Kindern unter 6 Monaten wird nicht empfohlen, vor der Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr soll ärztlicher Rat eingeholt werden.

Art der Anwendung: Zum Einnehmen. Die abgezählten Tropfen sollen in einem Glas mit etwas Wasser verdünnt werden. Otovowen® sollte nicht länger als 2 Wochen eingenommen werden. Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder nach 2 Tagen keine Besserung eintritt, ist ein Arzt aufzusuchen.

Weber & Weber GmbH, Herrschinger Str. 33, 82266 Inning/Ammersee.