

Interne Freigabenummer: EA068EAS_0726

FACHKURZINFORMATIONEN

Bezeichnung des Arzneimittels: easyangin Honiggeschmack 5 mg/1 mg Lutschtabletten

Qualitative und Quantitative Zusammensetzung: 1 Lutschtablette enthält 5 mg Chlorhexidin Dihydrochlorid (entspricht 4,4 mg Chlorhexidin) und 1 mg Lidocain Hydrochlorid Monohydrat (entspricht 0,8 mg Lidocain). Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: 1,21 g Sorbitol, Sulfite. Liste der sonstigen Bestandteile: Sorbitol, Magnesiumstearat, wasserfreie Zitronensäure, Stevia, Honigaroma. **Anwendungsgebiete:** Zur symptomatischen lokalen Behandlung des Rachenraumes als Antiseptikum und lokal wirkendes Schmerzmittel bei Halsschmerzen und Erkrankungen des Rachenraumes, Entzündungen wie Pharyngitis, Gingivitis, Stomatitis und Aphten. Bei einer mit Fieber einhergehenden bakteriellen Infektion ist eine zusätzliche Behandlung erforderlich. easyangin Honiggeschmack Lutschtabletten werden angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, Lokalanästhetika vom Amidtyp oder einen der sonstigen Bestandteile bei größeren, frischen Wunden im Mund- und Rachenraum. Kinder unter 6 Jahren. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Hals- und Rachentherapeutika, Antiseptika, ATC-Code: R02AA05, Lokalanästhetika, ATC-Code: R02AD02 **Inhaber der Zulassung:** Easypharm OTC GmbH, Mariahilfer Straße 116/6, AT-1070 Wien.

Rezeptpflicht/Apothekenpflicht: Rezeptfrei, apothekenpflichtig. **Stand der**

Fachkurzinformation: August 2024. **Weitere Angaben zu Warnhinweisen und**

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.

Bezeichnung des Arzneimittels: easyangin Mentholgeschmack 5 mg/1 mg Lutschtabletten

Qualitative und Quantitative Zusammensetzung: 1 Lutschtablette enthält 5 mg Chlorhexidin Dihydrochlorid (entspricht 4,4 mg Chlorhexidin) und 1 mg Lidocain Hydrochlorid Monohydrat (entspricht 0,8 mg Lidocain). Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: 1,21 g Sorbitol (E 420)/Lutschtablette. Liste der sonstigen Bestandteile: Sorbitol (E 420), Magnesiumstearat, Zitronensäure (wasserfrei), Menthol. **Anwendungsgebiete:** Zur unterstützenden, kurzzeitigen lokalen Behandlung bei leichten bis mittelschweren Entzündungen des Rachenraumes und der Mundhöhle (Halsschmerzen, Rachenkatarrh, Heiserkeit, Entzündungen des Mund- und Rachenraumes (Pharyngitis) sowie des Zahnfleisches). easyangin Mentholgeschmack Lutschtabletten werden angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, Lokalanästhetika vom Amidtyp oder einen der sonstigen Bestandteile. Bei größeren, frischen Wunden im Mund- und Rachenraum. Kinder unter 6 Jahren. easyangin Mentholgeschmack Lutschtabletten dürfen wegen des Gehaltes an Menthol nicht bei Patienten mit Asthma bronchiale oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen, angewendet werden. Die Inhalation von easyangin Mentholgeschmack Lutschtabletten kann zur Bronchokonstriktion führen.

Pharmakotherapeutische Gruppe: Hals- und Rachentherapeutika, Antiseptika, ATC-Code: R02AA05, Lokalanästhetika, ATC-Code: R02AD02 **Inhaber der Zulassung:** Easypharm OTC GmbH, Mariahilfer Straße 116/6, AT-1070 Wien. **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezeptfrei, apothekenpflichtig. **Stand der Fachkurzinformation:** August 2024. **Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.**

Bezeichnung des Arzneimittels: easyangin Zitronengeschmack 5 mg/1 mg Lutschtabletten
Qualitative und Quantitative Zusammensetzung: 1 Lutschtablette enthält 5 mg Chlorhexidin Dihydrochlorid (entspricht 4,4 mg Chlorhexidin) und 1 mg Lidocain Hydrochlorid Monohydrat (entspricht 0,8 mg Lidocain). Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: 5 mg Aspartam (E 951)/Lutschtablette und 1,21 g Sorbitol (E 420)/Lutschtablette. Liste der sonstigen Bestandteile: Sorbitol, Magnesiumstearat, Aspartam, Acesulfam Kalium, Zitronenaroma Sorbitol (E 420), Magnesiumstearat, Aspartam (E 951), Acesulfam Kalium, Zitronenaroma.
Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden, kurzzeitigen lokalen Behandlung bei leichten bis mittelschweren Entzündungen des Rachenraumes und der Mundhöhle (Halsschmerzen, Rachenkatarrh, Heiserkeit, Entzündungen des Mund- und Rachenraumes (Pharyngitis) sowie des Zahnfleisches). easyangin Zitronengeschmack Lutschtabletten werden angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, Lokalanästhetika vom Amidtyp oder einen der sonstigen Bestandteile. Bei größeren, frischen Wunden im Mund- und Rachenraum. Kinder unter 6 Jahren.

Pharmakotherapeutische Gruppe: Hals- und Rachentherapeutika, Antiseptika, ATC-Code: R02AA05, Lokalanästhetika, ATC-Code: R02AD02 **Inhaber der Zulassung:** Easypharm OTC GmbH, Mariahilfer Straße 116/6, AT-1070 Wien. **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezeptfrei, apothekenpflichtig. **Stand der Fachkurzinformation:** August 2024. **Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.**